



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## REGION POITOU-CHARENTES

Bulletin technique n°14 du 20 Mai 1998- 2 pages

### COLZA : stade G4

#### Pucerons cendrés

##### Situation

Les captures d'ailés restent abondantes à la tour à succion de Biard. Les réinfestations et recolonisations se poursuivent.

##### Préconisation

Continuez les protections dès que vous approchez les 2 colonies au mètre carré.

### POIS : stade floraison

#### Tordeuses

##### Situation

Des captures importantes sont enregistrées en toutes zones. Dans la majorité des pièges, on a atteint le seuil pois de semences (50 captures cumulées).

##### Préconisation

Une intervention est nécessaire sur pois de semences, au stade gousse plate du second étage florifère. Pour obtenir une protection complète, ce traitement sera renouvelé 15 jours plus tard. Utilisez un produit mixte si vous avez des pucerons.

Le traitement sur pois de consommation n'est pas justifié pour le moment ; attendre le prochain bulletin.

#### Pucerons

##### Situation-Préconisation

Celles du précédent bulletin restent valables.

#### Maladies

##### Situation-Préconisation

Terminez vos premiers traitements fongicides pour maîtriser l'anthracnose.

### CEREALES

#### BLE : stade début à mi-floraison

#### Pucerons des épis

##### Situation - Préconisation

Le vol à la tour et les populations en parcelles ont peu évolué (les pucerons sont encore peu présents dans la Vienne).

Les indications du dernier bulletin restent valables.

#### Maladies foliaires

##### Situation - Préconisation

Sauf cas très particuliers (parcelles non protégées, variétés très sensibles), les symptômes de septoriose et de rouille brune ont peu progressé.

Terminer la mise en oeuvre de la protection en situations très tardives.

Il est rappelé que la prise en compte de la fusariose ne se justifie que sur blé dur en cas de pluie courant floraison et que l'efficacité des produits autorisés n'est satisfaisante que pour des interventions placées 24 à 48 heures avant ou après les pluies.

##### Remarque

Des symptômes de jaunissements foliaires sur F2, F3 sont signalés ; aucune maladie n'a été mise en évidence ; il s'agit de réactions de la culture après des applications de triazoles, les plantes étant « fragilisées » en raison des conditions climatiques particulières (amplitude thermique...).

### MAIS : stade levée à 4-6 F. Sésamie

##### Situation

Quelques captures supplémentaires ont eu lieu du 14 au 18 en Sud Charente et en Charente-Maritime.

### COLZA

Pucerons :  
Réinfestations

### POIS

Pucerons  
verts :  
Surveiller  
Tordeuses :  
Nombreuses  
captures

### MAIS

Sésamie :  
Raisonner la  
protection

Service Régional de la  
Protection des Végétaux  
13 route de la Forêt  
86580 BIARD

Tél : 05.49.62.98.25  
Fax : 05.49.62.98.26

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles de POITOU-  
CHARENTES

Le Directeur-Gérant :  
L. JUILLARD CONDAT

Publication périodique  
C.P.P.A.P. n° 2139 AD  
ISSN n° 02294 470

D3 40 J 40830

770

### Préconisation

Elle concerne le maïs destiné à la consommation ou à l'ensilage.

Pour les zones définies dans le bulletin précédent, la stratégie à retenir est la suivante :

**ZONE 1** : traitement indispensable :

**ZONE 2 et ZONE 3** : Surveiller les parcelles à risques et **intervenir en présence de pieds de ponte** ; cependant dans le secteur du Sud Est Charente où ont eu lieu des captures, il est préférable d'envisager une intervention.

Les périodes optimum d'intervention sont les suivantes :

### **\* Stratégie à 2 applications :**

Intervenir du 30 Mai au 03 Juin avec un produit autorisé à demic-dose (voir dépliant maïs) ;

Le traitement sera renouvelé quinze jours plus tard afin de bien contrôler la 1ère génération.

Attention : différer ce 1er traitement si le maïs n'a pas atteint le stade 3 feuilles à cette date.

### **\* Stratégie à application unique :**

Elle est à envisager (si nécessaire) en zone 3, la pression exercée par la sésamie y étant faible à ce jour. Ce traitement est à appliquer du 4 au 8 Juin sous réserve de confirmation dans le prochain bulletin, cette période pouvant être retardée de quelques jours si la baisse des températures annoncée se confirme durablement.

# TOURNESOL

: stade de levée à 4 feuilles

## Pucerons

### Situation-Préconisation

Les captures à la tour sont très faibles ; en parcelles, les ailés et les aptères restent rares.

Surveiller les parcelles non traitées Gaucho (le seuil est de 30 à 50 pucerons par plante jusqu'à 5 feuilles, de 50 à 100 de 5 feuilles à E1).